

POUČENÍ PACIENTA

Zátěžové scintigrafické vyšetření prokrvení srdečního svalu

Vyšetření se provádí **nalačno**. V případě, že jste pozván/a na pozdější hodinu, se můžete lehce nasnídat. Vždy je však **nutné na 24 hodin před vyšetřením vyloučit všechny nápoje a potraviny obsahující kofein, tein a ostatní methylxantinové deriváty. Jedná se zejména o kávu, čaj, Coca Colu a obdobné nápoje, čokoládu, banány.** Je možné pít pouze vodu.

Diabetik si zachová svůj režim (snídá a vezme si obvyklé léky na cukrovku).

Po schválení Vaším ošetřujícím lékařem je třeba vysadit následující léky:

- které nesmíte užívat **2 dny před vyšetřením a v den vyšetření**:
 - beta-blokátory (např. Apo-metoprolol, Apo-pindolol, Atedon, Atenobene, Atenol, Betaloc, Concor, Cordanum, Egilok, Logimax, Pindolol, Sandoretic, Tenoretic, Tenormin, Trasicor, Trimecryton, Trimepranol, Vasocardin, aj.)
 - antagonisty kalcia (např. Agen, Aldizen, Altiazem, Amlopin, Apo-verap, Azupamil, Blocalcin, Diacordin, Dilacor, Dilrene, Dilzem, Isoptin, Lekoptin, Nifedipin, Norvasc, Orcal, Plendil, Presid, Verahexal, Verapamil, Zorem, aj.)
- neužívat **1 den před vyšetřením a v den vyšetření**:
 - nitráty (např. Deponit, Isoket, Lenitral, Maycor, Minitran, Monomack, Nitrangin, Nitrex, Nitroglycerin, Nitro-Mack, Nitromint, Nit-ret, aj.)
 - deriváty xantinu, centrální a periferní vasodilatancia (např. Agapurin, Aminophyllin, Corvaton, Enelbin, Molsihexal, Pentoxifyllin, Preductal, Syntophyllin, Trental, aj.)

Vezměte si s sebou svačinu a nápoj, protože po ukončení zátěžového testu je nutné, abyste se najedl/a. Rovněž si přineste všechny **léky, které užíváte**. K vyšetření je vhodné si přinést sportovní oděv a obuv, není to však nezbytně nutné. Vyšetření a s ním spojený pobyt u nás bude minimálně trvat celkem 4 – 5 hodin, může však dojít k prodloužení doby pobytu z důvodu nutnosti provedení akutního vyšetření u jiného pacienta.

V případě jakékoli nejasnosti se obraťte na pracovníky oddělení nukleární medicíny na tel. 572 529 753